

1

Alle Beschwerden können durch gezieltes Fragen weiter eingegrenzt werden – trotzdem bleibt Allergiediagnostik oft Detektivarbeit. So kann eine allmorgendlich verstopfte Nase auf eine [Hausstauballergie](#) hinweisen und auch Haustiere können für so manche Allergie verantwortlich gemacht werden. In verschiedenen Hauttests werden die unterschiedlichsten Substanzen getestet - Rötung, Juckreiz und eine Schwellung zeigen an, dass das Immunsystem wirklich auf die Substanz reagiert. Leider sind die Hauttests nicht immer zuverlässig.

Hiccups are very common and most people will get them at some point during their life. They can affect people of any age, including babies. Hiccups often occur without any obvious trigger, although short episodes have been linked with drinking alcohol, smoking, having a bloated stomach, eating too quickly or eating spicy foods, drinking hot or fizzy drinks. In rare cases, hiccups can last for a long time. Hiccups are not usually serious and in most cases only last a few minutes. However, you should see your GP if you have hiccups that recur frequently or last longer than 48 hours.

Che disturbi accusa?

Als Aortenaneurysma wird eine Gefäßerweiterung bezeichnet, die an der Hauptschlagader auftritt. Eine Ursache dafür, dass vor allem ältere Menschen von einem Aortenaneurysma betroffen sind, ist die abnehmende Elastizität der Gefäßwände im Alter. Da die Hauptschlagader einem vergleichsweise hohen Blutdruck ausgesetzt ist, reagieren die wenig elastischen Gefäßwände mit der Ausbildung eines Aortenaneurysmas. Begünstigt wird ein Aortenaneurysma außerdem durch verschiedene Risikofaktoren, wie vor allem einer Verkalkung der Gefäße. Auch vorliegender Bluthochdruck ist ein Faktor, der ursächlich an einem Aortenaneurysma beteiligt sein kann.

A broken finger may be:

- painful, swollen, and bruised
- stiff or difficult to move
- pointing in an unusual direction
- numb

In some cases, the broken bone may poke through the skin (an open fracture) or you may see the bone through the wound. It can be hard to tell if a finger is broken, dislocated or badly sprained, as the symptoms tend to be similar. .If you're not sure whether your finger is broken, it's a good idea to get medical advice.

Ha dolori all'orecchio?

Oft verursacht der Bandabriss ein hörbares Geräusch. Ansonsten schmerzt das betroffene Gelenk, es schwillt an und ein Bluterguss entsteht. Wichtigstes Zeichen ist aber die veränderte Beweglichkeit des Gelenks, die bei der ärztlichen Untersuchung geprüft wird. Gerade bei Knöchel- oder Knieverletzungen fühlt man sich auf dem betroffenen. Bei einem Bänderriss ist die Kraft, die auf das Band einwirkt, so groß, dass das straffe Bindegewebe zerreißt. Dabei muss anhand einer Röntgenaufnahme immer geprüft werden, wo das Band gerissen ist.

Aspirin is an antiplatelet medicine, which means it reduces the risk of clots forming in your blood. This reduces your risk of having a stroke or heart attack. Low-dose aspirin (usually 75mg a day) may be given to you if you have had a [heart attack](#), a [stroke](#) or [transient ischemic attack \(TIA\)](#), acute coronary syndrome (minor heart attack or unstable [angina](#)), a [coronary artery bypass operation](#), a stent put into any one of the arteries in your body.

Sente l'orecchio chiuso? senza dolori?

Die Bauchspeicheldrüsenentzündung äußert sich durch verschiedene Symptome. Die meisten der Patienten klagen über Schmerzen im Oberbauch und auch Übelkeit und Erbrechen sind keine seltenen Begleiterscheinungen der Bauchspeicheldrüsenentzündung. Die Bauchschmerzen können dabei bis in den Rücken oder den Brustkorb ausstrahlen. Erkrankungen der Gallenwege wie beispielsweise Gallensteine sind häufig eine Ursache der Bauchspeicheldrüsenentzündung. Doch auch Alkohol zählt nicht selten zu den Auslösern dieser Erkrankung.

Slapped cheek syndrome (also called fifth disease) is a viral infection that's most common in children, although it can affect people of any age. It usually causes a bright red rash to develop on the cheeks. Although the rash can look alarming, slapped cheek syndrome is normally a mild infection that clears up by itself in one to three weeks. Once you've had the infection, you're usually immune to it for life. After a few days, a distinctive bright red rash on both cheeks normally appears, although adults may not get this.

Lei è raffreddato?

Blasenentzündungen (auch: Harnblasenentzündung, Zystitis) werden von den Betroffenen meist recht schnell erkannt. Schmerzen im Unterleib, ein **ständiger Harndrang** und Schmerzen beim Wasserlassen sind die typischen Symptome für diese Erkrankung. Meist ist die gesamte Wand oder Schleimhaut der Harnblase entzündet, was die Ursache für die unerträglichen Schmerzen darstellt. Blasenentzündungen entstehen meist durch Bakterien aus der Darmflora, doch auch Würmer oder Viren können die Entzündung auslösen. Wird eine Blasenentzündung frühzeitig erkannt, heilt sie in den meisten Fällen innerhalb weniger Tage vollkommen aus.

Children and young adults are particularly prone to repeated attacks of nettle rash. Acute nettle rash can be divided into **allergic** and non-allergic nettle rash. It is important to know that very rarely, acute nettle rash can be the first symptom of a more serious and potentially life threatening reaction, known as anaphylaxis. This may lead to swelling of the face, hands and feet. Swelling may also affect the mouth, tongue, throat and breathing tubes, leading to wheezing and breathlessness and difficulty speaking or swallowing. The individual affected may also feel faint and sick and complain of stomach pains and develop vomiting.

Lei ha un tappo di cerume. Glielo tolgo subito con un lavaggio.

Es gibt verschiedene Gründe für das Auftreten einer Blutgerinnungsstörung. In einigen Fällen sorgt ein Mangel an Blutplättchen dafür, dass die beschädigten Blutgefäße durch diese nicht ausreichend verklebt und somit die Blutung nicht richtig gestoppt werden kann. Doch auch wenn Blutplättchen in ausreichender Menge vorhanden sind, kann es diesen an der Fähigkeit mangeln sich miteinander zu verkleben. Diese Fehlfunktion kann in seltenen Fällen vererbt werden.

Gastroenteritis is a very common condition that causes diarrhoea and vomiting. It's usually caused by a bacterial or viral tummy bug. It affects people of all ages, but is particularly common in young children. The main symptoms of gastroenteritis are:

- sudden [diarrhoea](#)
- feeling sick
- vomiting
- a mild fever

Some people also have other symptoms, such as a loss of appetite, an [upset stomach](#), aching limbs and [headaches](#).

Avverte dolore alla fronte? Alla guancia? Da quanto tempo?

Bluthochdruck ist eine weit verbreitete Gefäßerkrankung. Dabei ist der Druck, den das Blut bei jedem Herzschlag auf die Gefäße ausübt, zu hoch. Blutdrucksenkend wirken Medikamente, die die Wasser- und Salzausscheidung der Nieren anregen (vor allem Diuretika), die Gefäße erweitern (zum Beispiel Kalziumantagonisten) oder das vegetative Nervensystem dämpfen (zum Beispiel Beta Blocker). Die Behandlung wird individuell auf den Betroffenen zugeschnitten. Von Belang sind dabei beispielsweise das Alter und Vorerkrankungen.

Concussion should only be diagnosed by a health professional trained in assessing patients with head injury. They will be able to rule out serious brain injury that needs a brain scan or surgery. You should visit your nearest accident and emergency (A&E) department. [Symptoms of concussion](#) include brief loss of consciousness, memory loss, disturbances in vision, such as "seeing stars" or blurry vision, a period of confusion, a blank expression, or a delay in answering questions immediately after the head injury.

Non si preoccupi: faremo l'anestesia locale e non avvertirà alcun dolore.

Wird jahrelang nichts gegen Bluthochdruck unternommen, sind unwiderrufliche Schäden an den Gefäßen die Folge. Dies wiederum führt zu schweren Erkrankungen unterschiedlicher Organe.

- Herz: Der Bluthochdruck belastet ständig vor allem die linke Herzkammer. Daraus kann eine Herzmuskelschwäche ([Herzinsuffizienz](#)) entstehen. Zudem wird eine Arteriosklerose der Herzkranzgefäße begünstigt, was wiederum zu Durchblutungsstörungen am Herzen (koronare Herzkrankheit) und einem [Herzinfarkt](#) führen kann.
- Gehirn: Die Schädigung der Hirngefäße verursacht häufig einen [Schlaganfall](#)

A gastroscopy often takes less than 15 minutes, although it may take longer if it's being used to treat a condition. It's usually carried out as an outpatient procedure, which means you won't have to spend the night in hospital. Before the procedure, your throat will be numbed with a [local anaesthetic](#) spray. The doctor carrying out the procedure will place the endoscope in the back of your mouth and ask you to swallow the first part of the tube. It will then be guided down your oesophagus and into your stomach. The procedure shouldn't be painful, but it may be unpleasant or uncomfortable at times.

Ha dolori al collo? Alla gola? Si irradiano verso le orecchie? Da quanto tempo?

Als **Bradykardie** bezeichnet man beim Erwachsenen eine Herzfrequenz mit weniger als 60 Schlägen pro Minute. Häufig verursacht eine Bradykardie keine Symptome. Sportler beispielsweise spüren nicht, dass ihr Herz während der Ruhephasen langsamer schlägt, als bei Nichtsportlern. Manchmal ist die die Herzfrequenz so niedrig, dass weniger Blut in den Körperkreislauf gepumpt wird. Dadurch kann der Sauerstoffbedarf vor allem des Gehirns nicht mehr ausreichend gedeckt werden. [Kopfschmerzen](#), [Schwindel](#), Bewusstlosigkeit, Übelkeit und Erbrechen können die Folge sein.

Symptoms of laryngitis can begin suddenly and usually get worse over a period of two to three days. Common symptoms of laryngitis include:

- hoarseness
- speaking difficulty
- [sore throat](#)
- mild fever
- irritating [cough](#)
- a constant need to clear your throat

The hoarse voice and speaking difficulties usually get worse each day you're ill and may last for up to a week after the other symptoms have gone. In a few cases, the larynx can swell and cause breathing difficulties.

Tiri fuori la lingua. Respiri profondamente.

Während leichtere Verletzungen konservativ, d.h. ohne Operation behandelt werden, führt die komplexe Zerstörung von Bandscheiben und Wirbeln bei den schweren Verletzungen der Wirbelsäule zu einer instabilen Situation, bei der jede Belastung oder Verdrehung der Wirbelsäule zu einer Verschiebung von Wirbeln oder schlimmstenfalls zur Nerven- oder Rückenmarkschädigung führen kann. Etwa 20% der von einer schwereren Wirbelsäulenverletzung betroffenen Menschen erleiden dabei eine unvollständige bis komplette Lähmung. Das Behandlungsziel ist deshalb die schnellstmögliche Wiederherstellung von Stabilität, Belastbarkeit und Form der Wirbelsäule.

Croup usually affects young children aged between six months and three years, with most cases occurring in one-year-olds. However, croup can sometimes develop in babies as young as three months, and older children up to 15 years of age. The condition is more common during the late autumn and early winter months. If your GP thinks your child has mild croup, they will usually recommend managing it at home. This will often involve using children's [paracetamol](#) to ease any pain associated with the condition and may help lower your child's temperature if they have a fever. You should also ensure your child is well hydrated by encouraging them to drink plenty of fluids.

Lei deve stare a riposo assoluto. Lei non deve prendere freddo.

Durch eine Tastuntersuchung, eine [Computertomographie](#) oder eine Röntgenuntersuchung kann der Arzt feststellen, ob Verletzungen am Schädel oder in umliegenden Bereichen wie der Halswirbelsäule vorliegen. Bei einer langen Bewusstlosigkeit oder anhaltenden Erinnerungslücken muss zudem eine schwerere Verletzung am Gehirn ausgeschlossen werden. Hat das CT kein eindeutiges Ergebnis geliefert und bestehen weiterhin Beschwerden, kann der Arzt zusätzlich eine [Kernspin-Tomographie](#) (MRT) durchführen.

Angina is chest pain or discomfort that is caused when heart muscle does not get enough blood. Angina results from the demands of the myocardium being unable to be met by blood supply. This usually implies narrowing of one or more coronary arteries and it tends to occur at times when the heart has to do more work. You don't need to have a history of angina to have a heart attack. It isn't always easy to diagnose angina as there can be many reasons for chest pain. As well as a physical examination, you may have blood tests, an electrocardiogram (also called an ECG) to see how well your heart is working and tests to see how well your heart performs when you exercise.

Da quanto tempo ha mal di pancia?

Ein Beweis einer Durchblutungsstörung im Gehirn kann durch eine [Computertomographie](#) oder [Kernspintomographie](#) (MRT) erbracht werden. Damit lässt sich die Art der Schädigung und das betroffene Hirnareal genauer bestimmen. Zusätzliche Informationen für die Diagnose kann eine Ultraschalluntersuchung, eine Darstellung des Hirnkreislaufes, Injizieren von Kontrastmitteln, Untersuchen des Herzens auf mögliche Emboliequellen sowie Untersuchen des Blutes auf potentielle Gerinnungsstörungen liefern.

Broken or bruised ribs are usually caused by a fall or blow to the chest, or occasionally by severe coughing. They can be very painful, but will normally improve within about three to six weeks. Ribs can't be easily splinted or supported like other bones, so they're usually left to heal naturally. Broken and bruised ribs are generally treated in the same way, so it's not usually necessary to have an [X-ray](#) to determine what your exact injury is. You generally only need to seek medical advice if things get worse or don't improve, or if you were injured during a serious accident.

Ha avuto nausea? Vomito?

Der Vorgang des Schluckens kann nach einem Schlaganfall gestört sein. Man spricht dann von einer Dysphagie. Folgen können gelegentliches Verschlucken sein, aber auch eine nicht mehr mögliche Nahrungsaufnahme. Durch das Verschlucken und versehentliche Einatmen von Nahrung besteht die Gefahr einer Lungenentzündung (Aspirationspneumonie). Die Lungenentzündung ist eine häufige Ursache für eine erhöhte Sterblichkeit der Schlaganfallpatienten. Betroffene müssen daher künstlich über eine Sonde ernährt werden und die Sensibilität der Mundhöhle durch Schluck- und Kautraining zurückgewinnen.

The higher the location of the injury in the spinal cord (ie closer to the head), the greater the proportion of the body affected. Thus, injuries in the neck area (called the cervical region) have the most extensive consequences. Below the cervical level are the thoracic vertebrae. Injury in this region usually results in paralysis of the chest and abdominal muscles, whereas injury to the lumbar and sacral regions disrupts the control of leg and hip muscles.

Da quanto tempo la pancia è diventata gonfia?

Ursache des Ellenbogenbruchs ist zumeist ein direkte Trauma, also ein Sturz nach hinten oder zur Seite, der mit Ellenbogen oder gestrecktem Arm abgefangen wird. Wirkt hierbei eine zu starke Kraft auf die schwächste Stelle, das Ellenbogengelenk, so bricht dieses. Mechanisch lässt sich hierzu sagen, dass die Kraft des Aufpralls an der Stelle des geringsten Widerstands greift, das Gelenk bricht. Manchmal ist nicht ein Sturz der Auslöser, sondern ein heftiger Schlag mit einem harten Gegenstand auf das Ellenbogengelenk.

Septic shock is a life-threatening condition that happens when your blood pressure drops to a dangerously low level after an infection. Any type of bacteria can cause the infection. Fungi, such as candida, and viruses can also be a cause, although this is rare. At first, the infection can lead to a reaction called sepsis. This begins with weakness, chills, and a rapid heart and breathing rate. Left untreated, toxins produced by bacteria can damage the small blood vessels, causing them to leak fluid into the surrounding tissues.

Mi mostri la lingua per favore.

Die Ellenbogenverrenkung oder Ellenbogen-Luxation ist die vollständige Ausrenkung des Ellenbogengelenks. Zumeist wird sie durch Traumata ausgelöst und liegen zusätzlich Verletzungen der Seitenbänder, Nerven oder Knochenbrüchen vor. Bei Kindern ist die Ellenbogen-Luxation die häufigste Verrenkung, bei Erwachsenen nach der Auskuglung des Schultergelenks die zweithäufigste. Symptomatisch macht sich die Ellenbogen-Luxation durch eine Fehlstellung des Ellenbogens, starke Schmerzen und erhebliche Bewegungseinschränkungen des Ellbogens bemerkbar.

Sinusitis is usually the result of a cold or flu virus spreading to the sinuses from the upper airways. Only a few cases are caused by bacteria infecting the sinuses. An infected tooth or fungal infection can also occasionally cause the sinuses to become inflamed. It's not clear exactly what causes sinusitis to become chronic, but it has been associated with: allergies and related conditions, including allergic rhinitis, asthma and hay fever, nasal polyps, smoking, and a weakened immune system.

Occorre fare un esame del sangue.

Eine Embolie sollte keinesfalls mit einer Thrombose verwechselt werden. Zwar entsteht aus einem Thrombus häufig ein Embolus – dennoch handelt es sich um zwei unterschiedliche Krankheitsbilder. Bei einer Thrombose bildet sich das verstopfende Gerinnsel (Thrombus genannt) meistens direkt am Beschwerdeort. Bei der Embolie entsteht oft zu Beginn ein kleineres Gerinnsel, welches sich aber löst und in den Gefäßen herumwandert. Dabei kann es sich vergrößern und schlussendlich ein anderes Gefäß verstopfen. Von einer Embolie können übrigens ebenso Venen wie auch Arterien betroffen sein.

A sea creature sting can usually be treated with first aid. All stings are painful and cause swelling, inflammation or welts and nausea. Sea urchins usually sting your foot and often leave spines in the wound. Jellyfish often leave raised [blisters](#) on the skin in the shape of their own tentacles. Seek medical assistance if you've been stung while in the sea and your symptoms are severe – for example:

- severe, prolonged pain
- chest pain or breathing problems
- severe redness and swelling around the affected area
- fits or seizures

Ha dolore allo stomaco? A digiuno? Prima, dopo, a distanza dai pasti?

Als Endokarditis wird eine entzündliche Erkrankung der Herzinnenhaut (Endokard) bezeichnet, die zu entzündlichen Veränderungen der Klappensegel und zu Herzklappenfehlern führen kann. In Abhängigkeit von der zugrunde liegenden Ursache wird zwischen einer infektiösen bzw. bakteriellen und postinfektiös auftretenden abakteriellen bzw. rheumatischen Endokarditis differenziert, die sich jeweils anhand unterschiedlicher Symptome manifestieren. Eine bakterielle Endokarditis entsteht in aller Regel durch eine Besiedelung der Herzklappen durch bakterielle Erreger wie Staphylococcus aureus, Streptokokken oder Enterokokken.

Sudden shortness of breath, or breathing difficulty (dyspnoea), is the most common reason for visiting a hospital accident and emergency department. It's normal to get out of breath when you've overexerted yourself, but when breathlessness comes on suddenly and unexpectedly, it's usually a warning sign of a medical condition. You should call your GP immediately if you have sudden shortness of breath, as there may be a problem with your airways or heart.

Dopo questa comparsa di dolori ha avuto vomito? Svenimento?

Eine Erkrankung an der Hand oder am Arm kann die Lebensqualität enorm einschränken. Selbstverständliche Handgriffe können durch schmerzhafte Symptome verschiedener Krankheiten Bewegungen zur Qual machen. Eine der häufigsten Erkrankungen der Hände ist das Karpaltunnelsyndrom, das Schmerzen bis in die Arme auslösen kann. Dank modernster Handchirurgie können Krankheiten wie die diese mit sehr guten Erfolgen operativ behandelt werden. Eine andere, häufig auftretende Erkrankung der Hände ist Arthrose, von der - ähnlich wie beim Karpaltunnelsyndrom - Frauen öfter betroffen sind als Männer.

There's currently no cure for hay fever, but most people are able to relieve symptoms with treatment, at least to a certain extent. The most effective way to control hay fever would be to avoid exposure to pollen. However, it's very difficult to avoid pollen, particularly during the summer months when you want to spend more time outdoors. Treatment options for hay fever include antihistamines, which can help to prevent an allergic reaction from occurring and corticosteroids, which help to reduce inflammation and swelling.

Lei ha un'appendicite acuta e deve essere operato d'urgenza.

Das Erysipel ist eine durch Bakterien ausgelöste Hauterkrankung. Durch kleine Wunden an der Körperoberfläche können Bakterien in tiefere Hautschichten gelangen, und sich dort vermehren. Der Körper versucht diese Bakterien zu bekämpfen, und es kommt zu einer Entzündung der Haut. Es entsteht eine flächige, meist scharf begrenzte Rötung und schmerzhafte Schwellung. Sie kommt häufig an den Unterschenkeln vor, kann jedoch überall am Körper auftreten.

Heart failure does not often have a single cause. There are a number of health conditions that increase your chances of developing heart failure, including: [high blood pressure](#) (hypertension) – this can put extra strain on the heart, which over time can lead to heart failure, [coronary heart disease \(CHD\)](#) – where the arteries that supply blood to the heart become clogged up by fatty substances), and may cause [angina](#) or a [heart attack](#), heart muscle weakness (cardiomyopathy) – this can cause heart rhythm disturbance (atrial fibrillation), heart valve disease or problems with the heart's valves

Lei necessita di un ricovero ospedaliero per accertamenti.

Die Ursachen einer Fallsucht sind vielfältig und in den meisten Fällen noch nicht vollständig geklärt. Oft spielen Gene eine Rolle bei der Entstehung der Epilepsie. Vererbbar ist sie deswegen meist trotzdem nicht – die Eltern geben meist lediglich eine größere Anfälligkeit für Krampfanfälle an ihre Kinder weiter. Zur Erkrankung kommt es dann erst, wenn äußere Faktoren hinzukommen. Nur in seltenen Fällen sind fehlerhafte Gene bekannt, die unmittelbar epileptische Fälle auslösen. Dann spricht man von einer genetischen Epilepsie.

Beta-blockers, are medications used to treat conditions such as angina, heart failure and high blood pressure. They decrease the activity of the heart by blocking the action of hormones like adrenaline. Beta-blockers are [prescription-only medicines](#), which means they can only be prescribed by a GP or other suitably qualified healthcare professional. You may experience [side effects while taking beta-blockers](#), including: dizziness, tiredness, blurred vision, cold hands and feet, slow heartbeat [diarrhoea](#), and nausea.

Da quanto tempo ha smesso completamente di urinare?

Fieber ist keine eigenständige Krankheit, sondern eine Schutzreaktion des Körpers gegen Infektionen durch Bakterien oder Viren. Die Temperaturerhöhung bewirkt, dass der Körper seine Abwehrkräfte mobilisiert, um so die eingedrungenen Krankheitserreger effektiv zu entfernen. Wenn ein Kind fiebert, hilft es also zunächst einmal sich selbst. Hohes Fieber (ab 39,5 Grad Celsius) kann allerdings wichtige Körperfunktionen beeinträchtigen und ist für den Organismus eine große Belastung.

If the break is small or it is just a crack, you may not feel much pain or even realise that you have broken a bone. However, if you suspect that you have broken a bone, you should seek medical help immediately. The broken bone must be properly aligned and held in place (often with a plaster cast) so that it heals in the correct position. If you do not receive the correct treatment, you could develop a serious infection or a permanent deformity. You may also develop long-term problems with your joints.

Da quanti giorni ha la febbre il bimbo?

Eine Gallenblasenentzündung tritt häufiger bei Frauen auf, aber auch Männer können daran erkranken. Insgesamt kommt die Erkrankung recht häufig vor. In mehr als 90 Prozent der Fälle sind **Gallensteine** die Ursache der Entzündung. In seltenen Fällen kann es im Zusammenhang mit einer künstlichen Ernährung (zum Beispiel bei Intensivpatienten) oder einer Salmonelleninfektion zu einer Gallenblasenentzündung kommen.

There is a wide range of blood pressure-lowering medicines to choose from and a combination is usually needed to treat high blood pressure most effectively and with the minimum side effects. In some cases, you may need to take blood pressure-lowering medication for the rest of your life. However, if your blood pressure levels stay under control for several years, your doctor might be able to reduce or stop your treatment. It's really important you take your medications as directed. If you miss doses, the treatment will not work as effectively and you could lose protection against future illness.

Il bambino ha avuto malattie infettive? Morbillo? Scarlattina? Rosolia?

Die vorrangige Ursache für Ablagerungen an den Gefäßwänden ist die [Arteriosklerose](#), bei der Cholesterinablagerungen zu Verengungen der Gefäße führen. Diese Erkrankung betrifft zunächst das gesamte Gefäßsystem, auch wenn Verengungen in den Herzkrankgefäßen besonders häufig sind. Trotzdem können sich Thromben an allen Stellen des Körpers im Gefäßsystem bilden. So werden Schlaganfälle ebenso wie Herzinfarkte durch akute Gefäßverschlüsse ausgelöst. Die Zahlen der Schlaganfallpatienten ist dabei ebenso alarmierend hoch wie die der Herzinfarkt-Erkrankten.

Common signs of an underactive thyroid are tiredness, weight gain and feeling depressed. An underactive thyroid can often be successfully treated by taking daily hormone tablets to replace the hormones your thyroid isn't making. There's no way of preventing an underactive thyroid. Most cases are caused either by the immune system attacking the thyroid gland and damaging it, or by damage to the thyroid that occurs during some treatments for an overactive thyroid or thyroid cancer.

Ha raffreddore? Mal di orecchie? Mal di gola?

Eine Gehirnerschütterung ist oftmals eine Verletzung oder Schädigung am Gehirn bzw. Kopf. Dabei kann es unter Umständen zu einer kurzen **Bewusstlosigkeit** kommen. Bei einer Gehirnerschütterung handelt es sich um die leichteste Form eines Schädel-Hirn-Traumas. Nach einem Sturz oder einem Schlag auf den Kopf können eine kurze Bewusstlosigkeit und Symptome wie Benommenheit, Erinnerungslücken, Kopfschmerzen und **Übelkeit** auftreten. Besteht der Verdacht, dass eine Gehirnerschütterung vorliegt, sollte – insbesondere wenn **Babys** und Kleinkinder betroffen sind – ein Arzt aufgesucht werden.

There are three main types of ECG: a resting ECG – carried out while you're lying down in a comfortable position; a stress or exercise ECG – carried out while you're using an exercise bike or treadmill; an ambulatory ECG – the electrodes are connected to a small portable machine worn at your waist so your heart can be monitored at home for one or more days. The type of ECG recommended for you will depend on your symptoms and the heart problem suspected.

Ha difficoltà di respiro?

Die Gürtelrose, dessen Fachbegriff Herpes Zoster ist, ist eine Virusinfektion. Ihre Hauptsymptome sind brennende Schmerzen und Ausschlag in Form von Blässchen. Das verantwortliche Virus Varicella Zoster Virus (VZV) ist bei Krankheitsausbruch bereits im Körper vorhanden gewesen. Gürtelrose tritt nur bei Patienten auf, die bereits an Windpocken erkrankt waren, da der Virus Auslöser und Ursache für beide Erkrankungen ist. Der Verlauf einer Gürtelrose vollzieht sich in der Regel ohne Komplikationen. Obwohl eine Behandlung durch einen Arzt sinnvoll erscheint, heilen etwa 60 Prozent aller Fälle innerhalb von zwei bis vier Wochen von selbst.

There are probably many reasons why a miscarriage may happen, although the cause isn't usually identified. The majority aren't caused by anything the mother has done. If you have the symptoms of a miscarriage, you'll usually be referred to a hospital for tests. In most cases, an ultrasound scan can determine whether the pregnancy is ongoing or you're having a miscarriage. When a miscarriage is confirmed, you'll need to talk to your doctor or nurse about the options for the management of the end of the pregnancy.

Il bambino ha dolori addominali?

Typische Auslöser von akuten Halsschmerzen sind Erkältungskrankheiten, Entzündungen der Mandeln oder andere Entzündungen im Mund- und Rachenraum – meist ausgelöst durch Viren, seltener auch Bakterien. Auch schwerere Infektionen wie Scharlach oder Diphtherie kündigen sich mit Halsschmerzen an. Heiserkeit ist ein Zeichen dafür, dass die Entzündung auch den Kehlkopf mit seinen Stimmbändern betrifft.

Fainting is a sudden, temporary loss of consciousness that usually results in a fall. Healthcare professionals often use the term "syncope" when referring to fainting, because it distinguishes fainting from other causes of temporary unconsciousness, such as seizures (fits) or concussion. In most cases, when a person faints, they'll regain consciousness within a minute or two. However, less common types of fainting can be medical emergencies. In most cases, a person will return to normal within a few minutes of fainting, and no further treatment will be needed.

Ha notato macchie sulla pelle del bambino?

Halsschmerzen werden meist durch Erkältungsviren verursacht. Kommen keine anderen Beschwerden hinzu, klingen die Symptome normalerweise innerhalb weniger Tage ab. Bei Fieber über 38,5 Grad Celsius oder wenn weiße, punktförmige Ablagerungen auf den Gaumenmandeln zu sehen sind, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Weitere Warnzeichen: Druckschmerzhaftes Halslymphknoten, sehr starke Schluckbeschwerden sowie Heiserkeit und Schluckbeschwerden, die länger als eine Woche andauern.

Minor head injuries are common in people of all ages and rarely result in any permanent brain damage. The [symptoms of a minor head injury](#) are usually mild and shortlived. They may include: a mild [headache](#), nausea (feeling sick), mild dizziness, mild blurred vision. If your child's symptoms get significantly worse, take them straight to the [accident and emergency \(A&E\) department](#) of your nearest hospital or call 118 for an ambulance.

Spogli il bambino per cortesia, e lo metta sdraiato sul letto.

Bei Verletzungen der Halswirbelsäule, die mit Nervenausfällen einher gehen, stehen diese zunächst im Vordergrund. Der Verletzte selbst wird – soweit er bei Bewusstsein ist – über Gefühlsausfälle oder eine Bewegungsunfähigkeit von Armen und Beinen berichten, die eindeutige Hinweise auf die Höhe des verletzten Wirbelsäulenabschnittes geben. Liegen keine Nervenausfälle vor, so werden meist folgende Symptome angegeben:

- Schmerzen in der Halswirbelsäule und im Nacken in Ruhe und/oder bei Bewegung
- Eine Fehl-/Schiefstellung des Kopfes
- Das Gefühl, den Kopf selbst nicht mehr halten zu können

Depending on where the clot forms, this can lead to serious problems such as: [strokes](#) or [transient ischaemic attacks](#), [heart attacks](#), [deep vein thrombosis \(DVT\)](#), [pulmonary embolism](#). Treatment with anticoagulants may be recommended if your doctor feels you're at an increased risk of developing one of these problems. This may be because you've had blood clots in the past or you've been diagnosed with a condition such as [atrial fibrillation](#) that can cause blood clots to form.

Se in passato il bambino ha avuto i disturbi che presenta ora, quali cure ha seguito?

Die Hautrötung tritt meist als infektiöse Reaktion auf das Eindringen von Krankheitserregern auf. Teils markiert die Veränderung der Haut die Stelle, an der die Infektion stattgefunden hat - teils hat die betroffene Stelle der Haut auch gar nichts mit dem Entzündungsherd zu tun. Die [Wundrose](#) gehört beispielsweise zu den Erkrankungen, die die betroffene Stelle des Körpers erröten lassen. Es handelt sich dabei um eingedrungene Bakterien, die unter der Haut liegen und von dort aus dafür sorgen, dass sie sich verändert. Bei der [Nesselsucht](#) hingegen bilden sich rote Quaddeln, die nicht direkt mit der ursächlichen Erkrankung zu tun haben.

A slipped disc – known as a prolapsed or herniated disc – occurs when one of the discs that sit between the bones of the spine (the vertebrae) is damaged and presses on the nerves. This can cause back pain and neck pain, as well as symptoms such as numbness, a tingling sensation, or weakness in other areas of the body. The sciatic nerve is often affected in cases of slipped disc. It is the longest nerve in the body and runs from the back of the pelvis, through the buttocks and down both legs to the feet. If pressure is placed on the sciatic nerve (sciatica), it can cause mild to severe pain in the leg, hip or buttocks.

Il bambino va ricoverato in ospedale e non può affrontare il viaggio di ritorno.

Hernien können verschiedensten Ursachen haben. Häufig entstehen sie nach einem Hebetauma, also einer Verletzung in Folge einer zu starken Belastung. Auch chronischer Husten sowie Verstopfung oder Dickdarmkrebs können Weichteilbrüche verursachen. Ebenso eine plötzliche Gewichtszunahmen, eine [Schwangerschaft](#) oder verschiedene [Lebererkrankungen](#). Vor allem Erkrankungen, die mit Bauchwasserbildung einhergehen, begünstigen die Entstehung einer Hernie. Dasselbe gilt für [Bindegewebsschwächen](#). Generell kommt es mit zunehmendem Alter häufiger zu Hernien. Die genauen Ursachen sind oftmals ungewiss, was eine zielgerichtete Behandlung erschwert

The heart is essentially a pump made of muscle, which is controlled by electrical signals. These signals can become disrupted for several reasons, which can lead to a number of potentially dangerous heart conditions, such as: an abnormally slow heartbeat **or** an abnormally fast heartbeat. Having a pacemaker implanted is a relatively straightforward process. It's usually carried out under local anaesthetic, which means you'll be awake during the procedure. The generator is usually placed under the skin near the collarbone on the left side of the chest. The generator is attached to a wire that's guided through a blood vessel to the heart. The procedure usually takes about an hour, and most people are well enough to leave hospital the day after surgery.

La febbre va misurata ogni quattro ore e va segnata.