

## UTILIZZO DEL MEZZO DI CONTRASTO

### NOTA INFORMATIVA SULLA PREPARAZIONE FARMACOLOGICA IN SOGGETTI ALLERGICI E

#### DICHIARAZIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE

Gli assistiti che devono eseguire un esame radiologico con mezzo di contrasto somministrato per via endovenosa e che abbiano una anamnesi positiva per allergia sono tenuti ad eseguire una **preparazione farmacologica** prima di sottoporsi all'esame.

- La preparazione farmacologica va eseguita in accordo con il **proprio medico curante, cui è demandata la prescrizione dei farmaci stessi**. Per eventuali chiarimenti in merito, il curante potrà a sua discrezione contattare il Centro Medico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 al numero 0421.244.016.
- Assistiti per i quali va eseguita la preparazione farmacologica:
  - Soggetti con **allergia nota al mezzo di contrasto**;
  - Soggetti **asmatici**;
  - Soggetti **allergici in trattamento, continuo o meno, per il controllo dei sintomi** (es.: allergia al latte, al pelo degli animali, agli acari della polvere, alle graminacee, al nichel, ecc.);
  - Soggetti con storia pregressa di **importante reazione allergica** dopo esposizione a farmaci, veleno di imenotteri (api, vespe, ecc.), alimenti, ecc.
- Per importante reazione allergica si intende la comparsa di **anche solo una delle seguenti manifestazioni**:
  - **Respiratorie** (broncospasmo, edema delle vie aeree, angioedema, ecc.);
  - **Cardiovascolari** (ipotensione, lipotimia, ecc.);
  - **Cutanee** (reazioni orticarioidi, prurito diffuso, ecc.);
  - **Gastrointestinali** (nausea, vomito, ecc.).

#### ▪ Preparazione farmacologica

12 ore prima dell'esame	Cortisonico: Prednisone (es.: Deltacortene): 25mg 2 compresse; Gastroprotettore: Pantoprazolo (es.: Pantorac): 40 mg 1 compressa; Antistaminico: Cetirizina (es.: Zirtec): 10 mg 1 compressa;
6 ore prima dell'esame	Cortisonico: Prednisone (es.: Deltacortene): 25mg 2 compresse;

Nel caso di persona per la quale non sia indicato assumere il cortisone sarà necessario somministrare Clorfenamina cloridrato (es.: Trimeton 10 mg - 1 fiala intramuscolo) prima dell'esame.

- Poiché la maggior parte delle possibili reazioni al mezzo di contrasto tendono a verificarsi nei primi 20 minuti dalla somministrazione dello stesso, l'assistito è tenuto a **trattenersi presso il Centro Medico** almeno 30 minuti dopo conclusione dell'esame.
- Poiché l'assunzione di Cetirizina (es.: Zirtec) potrebbe dare sonnolenza si consiglia, inoltre, di **non guidare l'auto**, né intraprendere altre attività che richiedano un normale livello di attenzione fino a 12 ore dopo la assunzione del farmaco.

**N.B.: È necessario essere a digiuno da almeno tre ore prima dell'esecuzione dell'esame.**

#### DICHIARAZIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE

Io sottoscritto (cognome e nome) \_\_\_\_\_

- Dichiaro di aver preso visione di quanto sopra riportato e di aver avuto la possibilità di chiedere eventuali delucidazioni in merito presso il Centro Medico, avendo ottenuto risposte chiare ed esaurienti.
- Dichiaro di aver assunto la preparazione farmacologica qui sopra consigliata in accordo con il mio medico curante.

Fossalta di Portogruaro, \_\_\_\_\_

Firma .....